

その他

アンツバスター

イエヒメアリ、クロアリ、アカアリ、オオハリアリ、ルリアリ、トビイロシワアリ、ハヤアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリの駆除

有効成分

ヒドラメチルノン(アミジノヒドラゾン系)

商品仕様

梱内容●200g×6袋

使用場所



工場・倉庫、ホテル旅館、飲食店舗・
厨房周辺、ビル、公園・駐車場・道路

特長

- ① アンツバスターには、アリの好む天然の食品素材をバランスよく配合しており、その成分を餌として認識し、各種のアリが集まります
- ② アリには有効成分ヒドラメチルノンに対する忌避性がなく、さらにヒドラメチルノンは遅効性であるため、アリはアンツバスターを巣に持ち帰ります
- ③ アンツバスターは巣の中で働きアリから女王アリ、雄アリ、兵アリ、幼虫などに分け与えられます
- ④ ヒドラメチルノンの作用が穏やかに、また徐々に進行して駆除効果を現します
- ⑤ その結果、巣全体のアリが死亡し、巣は崩壊します



使用方法

- アンツバスターを2～5g、アリが出入りできる適当な容器に入れるか紙の上に置き、アリの出没している場所(巣穴付近や通り道など)に数ヵ所設置してください。
- 数分～数十分後、アリが誘引され盛んにアンツバスターを運搬します。量が足りない場合は補充し、アリが駆除できたら取り除いてください。巣は2～3日後に崩壊します。
- アリの巣の大きさ、種類によって適宜処理場所を増やしたり、処理量を加減してください。

※アンツバスターの効果的な処理方法：アリの出ている場所に応じて適宜設置します。室内で使用する場合は、アリが出入りしている隅の方か、侵入口を確かめ、できるだけ巣に近い方に置くと効果的です。戸外では直射日光を避けて巣の近くに置いてください。

効力データ

全ての階級のアリに効果発現

全ての階級のアリを死亡させて巣を崩壊させます。

アンツバスターを処理したオオズアカアリのコロニー内の状況

コロニーNo.	総アリ数	処理後経過日数	生存数	致死数		
				女王アリ	兵アリ	働きアリ
1	3,847	26	2	12	86	3,747
2	4,530	31	1	6	53	4,470

(当社データ)

優れた運搬活性

各種のアリが積極的に巣に運び込みます。

2種類のアリに対する経時的運搬活用

経過時間	オオズアカアリ			トビイロシワアリ		
	誘引数	運搬数	運搬率	誘引数	運搬数	運搬率
0～1時間	1,171	1,161	99.1%	333	283	85.0%
1～2時間	35	3	8.6%	6	5	83.3%
2～5時間	32	7	21.9%	9	0	0.0%
合計	1,238	1,171	94.6%	348	288	82.8%

2日以降、巣から出るアリは見られなくなりました。(当社データ)

イエヒメアリに対する効果

U総合病院でイエヒメアリの発生があった部屋29室に、アンツバスターを40箇所処理した結果、24時間後から急速に集まるイエヒメアリが減少し、7日後には全くその姿が見られなくなりました。これは働きアリが死滅し、巣が崩壊したためです。

アンツバスターに集まったイエヒメアリの数と箇所数

処理後の経過時間	アリの来た箇所数(集まったアリの数別)				合計
	<10匹	<40匹	<100匹	>100匹	
2～6時間	4箇所	9箇所	16箇所	7箇所	36箇所
24時間	21箇所	1箇所	0	0	22箇所
7日	0	0	0	0	0
2ヵ月	アリの出現なし。				
4ヵ月	アリの出現なし。				

(当社データ)