

ネコソギクイックプロFLは

困った雑草に 頼れる1本

水田のあぜ道

果樹園・畑

家まわりの雑草

こんな雑草に



竹



セイタカアワダチソウ



ササ



カナムグラ(つる性植物)



ツユクサ



ススキ



スギナ



オオバコ



ドクダミ

写真は生育期のものです

速く効く除草剤



散布前



散布3日後



散布7日後

100倍希釈液を100ml/m²に散布

使い方は
こちらから



5ℓ入

除草剤

ネコソギクイックプロFL

茎葉処理型除草剤

ネコソギ[®]クイックプロFL[®]の効果・効能

- 非選択性の茎葉処理型除草剤で、雑草の地下部まで枯らします。
- 成分は葉や茎から吸収されて、すばやい効果を発揮します。
そのため、地上部がある程度（30cm程まで）伸びている雑草に使用します。
- 笹・ススキ・竹などの難防除とされる雑草にも効果を示します。

**メガソーラー用地や
空き地、道路わき、
工場敷地などにも**



商品名	ネコソギクイックプロFL
登録番号	農林水産省登録 第21593号
農薬の種類	グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤
有効成分	グリホサートイソプロピルアミン塩 30.0% ピラフルフェンエチル 0.16% 水、界面活性剤等 69.84%
性状	類白色水和性粘稠懸濁液体

使用方法

宅地等の一年生および多年生雑草には水で100倍に希釈、スギナには25～50倍に希釈し、雑草の葉や茎に薬液がまんべんなくかかるように散布する。1㎡当たり100mℓの薬液を散布するのが目安。竹には、1本当たり原液10～20mℓを節間に穴を開け注入する（竹は枯れるまで数ヶ月かかる）。

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
水田作物（水田畦畔）	水田畦畔	一年生及び多年生雑草	収穫14日前まで （雑草生育期：草丈30cm以下）	0.4～0.6ml/m ²		2回以内	雑草茎葉散布	3回以内	2回以内
水田作物（水稻を除く）	—	一年生雑草	耕起20～10日前（雑草生育期）			1回		2回以内	1回
移植水稻						2回以内		3回以内	2回以内
直播水稻									
水田作物、畑作物（休耕田）	休耕田	一年生及び多年生雑草	雑草生育期（草丈50cm以下）	0.5～1ml/m ²	2回以内	3回以内		2回以内	
水田作物（水田刈跡）	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	0.4～0.6ml/m ²	1回	1回		1回	1回
		多年生雑草		0.5～1ml/m ²					
果樹類 （かんきつ、キウイフルーツ） パイナップルを除く	—	一年生及び多年生雑草	収穫7日前まで （雑草生育期：草丈30cm以下）	0.4～1ml/m ²	3回以内	3回以内		3回以内	3回以内
かんきつ						5回以内			
だいこん		一年生雑草	耕起またはは種7日以前 （雑草生育期：草丈30cm以下）	0.4～0.6ml/m ²	1回	2回以内		1回	
キャベツ、はくさい						1回			
ねぎ					3回以内	3回以内		3回以内	
たまねぎ （秋播移植栽培）						1回		3回以内	
えだまめ						3回以内		4回以内	
だいず					は種後出芽前 （雑草生育期：草丈30cm以下） 畦間処理：雑草生育期 （草丈30cm以下）但し、収穫前日まで	2回以内			4回以内
樹木等	公園、庭園、堤とう、 道路、運動場、 宅地、鉄道、のり面等	一年生及び多年生雑草	雑草生育期（草丈50cm以下）	0.5～1ml/m ²	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内	3回以内	
		スギナ	雑草生育期（草丈30cm以下）	1～4ml/m ²					
作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍率	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
樹木類、畑作物	林地、放置竹林、畑地	竹類	夏～秋期	原液	10～20ml/本	—	竹稈注入処理	—	—

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10

お問い合わせ TEL03-6740-7777（平日9:00～17:00 土・日・祝日は休み）