

## 普通物のフロアブル剤

# オプティガード®

## 土壌処理用ZTフロアブル剤

### 製品の概要

有効成分	チアメトキサム (防蟻)	20w/w%
剤型	フロアブル剤	
外観	白色から淡褐色 水和性粘稠懸濁液体	
消防法	非該当	
毒劇物取締法	普通物	
改正建築基準法	シックハウス13指定物質を含みません	

### 使用方法

- オプティガードZT 1kgを水199ℓで希釈した200倍希釈液を帯状散布法で5ℓ/m<sup>2</sup>、面状散布法で3ℓ/m<sup>2</sup>となるように土壌に散布してください。
- ご使用前は、フロアブル剤のため容器をよく振り混ぜてください。
- 希釈液を静置後の使用の際も、再攪拌してからご使用ください。
- 基本的には、希釈液は調製したその日のうちに使いきってください。
- 他剤との混用は避けてください。
- 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、家畜、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気製品等はあらかじめ移す、あるいは格納し、本剤がかからないようにしてください。
- 観賞用、または装飾用の金属に対しては、本剤がかからないように注意してください。
- 飛沫の付着が心配されるような場所に関しては、変色が起こらないことを確認してください。

### 特長

- 安全性**：人および動物、水生動物への毒性が低く、高い安全性が確認されています。
- 効力**：忌避性がなく、食毒と接触毒で致死効果を発揮し、残効性があります。
- 臭い**：施工中の異臭もなく、残臭もありません。
- 飛散性**：フロアブル剤ですので、水希釈時の粉立ち、飛散の心配はありません。
- 忌避性**：ありません。

(社) 日本しろあり対策協会認定  
(社) 日本木材保存協会認定  
(財) 文化財虫害研究所認定

乾材シロアリ用駆除剤登録証



カンザイシロアリ



カンザイシロアリのフン



- 発泡施工やULV施工の実績があります。



## 防カビ効果もある木部処理剤

# オブティガード®

## 木部処理用20EC乳剤

(社) 日本しろあり対策協会認定  
(社) 日本木材保存協会認定  
(財) 文化財虫害研究所認定

### 製品の概要

有効成分	チアメトキサム (防蟻)	2w/w%
	シプロコナゾール (防腐)	2w/w%
	チアベンダゾール (防カビ)	4w/w%

剤型	乳剤
外観	淡黄褐色澄明液体
消防法	第4類第3石油類
毒劇物取締法	普通物
改正建築基準法	シックハウス13指定物質を含みません

### 使用方法

- オブティガード20EC 1ℓに対して水19ℓを均一に希釈した20倍希釈液を300ml/m<sup>2</sup>となるように木部に塗布または噴霧してください。
- 希釈液は、調製したその日のうちに使い切ってください。
- 他剤との混用は避けてください。
- 水道水を使用してください。
- 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、家畜、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気器具等はあらかじめ移す、あるいは格納し、本剤がかからないようにしてください。
- 観賞用または装飾用の金属に対しては、本剤がかからないように注意してください。
- 飛沫の付着が心配されるような場所に関しては、変色が起こらないことを確認してください。

### 特長

- 安全性**：人およびその他の動物、水生動物への毒性が低く、高い安全性が確認されています。
- 効力**：配合防蟻剤は、食毒と接触毒で致死効果を発揮します。また、配合3主成分は残効性に優れているため防蟻、防腐、防かび効果が期待されます。
- 臭い**：低臭性で、施工中の異臭発生や残臭の心配はありません。
- 飛散性**：乳剤ですので、水希釈時の粉立ち、飛散の心配はありません。
- 忌避性**：ピレスロイドに比べると忌避性はありませんが、オブティガードZTおよびLTに比べると若干の忌避性があります。

